PROVA SCRITTA 1

1. **L'articolazione radiocarpica è:**
 - A. un'articolazione a sella
 - B. un'articolazione ginglymo angolare
 - C. un'articolazione ellissoide
 - D. un'articolazione enartrosi

2. **Quali dei seguenti componenti non attraversa il tunnel carpale:**
 - A. mm flessore ulnare del carpo
 - B. mm flessore radiale del carpo
 - C. mm flessore profondo delle dita
 - D. nervo mediano

3. **Il muscolo sartorio origina da:**
 - A. SIAI
 - B. legamento inguinale
 - C. SIAS
 - D. fossa iliaca

4. **La sindrome di Brown-Séguard comporta:**
 - A. solo disturbi sensitivi di tipo termodolorifico nell'emisoma omolaterale alla lesione
 - B. solo disturbi motori nell'emisoma omolaterale alla lesione
 - C. disturbi motori omolaterali e termodolorifici controlaterali alla lesione
 - D. disturbi motori controlaterali e termodolorifici omolaterali alla lesione

5. **I principali disturbi che caratterizzano la malattia di Parkinson sono:**
 - A. tremore a riposo, deficit di coordinazione, rigidità
 - B. tremore essenziale, rigidità ed acinesia
 - C. tremore essenziale, deficit di coordinazione, acinesia
 - D. tremore a riposo, rigidità ed acinesia

6. **La classificazione CDR 2 in un paziente con disturbi cognitivi indica:**
 - A. demenza lieve
 - B. demenza moderata
 - C. demenza grave
 - D. demenza molto grave

7. **Quale dei seguenti è il X nervo cranico:**
 - A. nervo trigemino
 - B. nervo glossofaringeo
 - C. nervo accessorio spinale
 - D. nervo vago

8. La memoria di lavoro fa parte della:

- A. memoria a breve termine
- B. memoria a lungo termine
- C. memoria episodica
- D. memoria procedurale

9. La Sclerosi Multipla è:

- A. una patologia autoimmune infiammatoria
- B. una patologia neurodegenerativa
- C. una patologia sia autoimmune infiammatoria che neurodegenerativa
- D. nessuna delle precedenti

10. La Glasgow Coma Scale (GCS) valuta:

- A. apertura degli occhi
- B. risposta verbale
- C. risposta motoria
- D. tutte le precedenti

11. La scala Barthel Index viene utilizzata per quantificare:

- A. il grado di autonomia del paziente nelle ADL
- B. la capacità di deambulare in sicurezza
- C. il rischio di caduta
- D. il grado di disfagia

12. Quale delle seguenti scale di valutazione è più utile per valutare la disfagia:

- A. Glasgow Coma Scale (GCS)
- B. Gugging Swallowing Screen (GUSS)
- C. Clinical Dementia Rating Scale (CDR)
- D. nessuna delle precedenti

13. Quale dei seguenti elementi non è un DPI:

- A. guanti in lattice
- B. estintore
- C. guanti in nitrile
- D. sovracamice

14. Quale delle seguenti scale può essere utilizzata per valutare le funzioni cognitive e/o l'orientamento s/t/p:

- A. SPMSQ
- B. MMSE
- C. MOKA
- D. tutte le precedenti

15. Quale dei seguenti ausili per i trasferimenti rientra nella categoria delle "ausili minori":

- A. disco girevole
- B. sollevatore passivo
- C. sollevatore attivo o verticalizzatore
- D. carrozzina pieghevole

16. Da quali fasi è caratterizzata la tosse:

- A. irritativa, inspiratoria, espiratoria, cessazione
- B. inspiratoria, compressiva, espiratoria, rilassamento
- C. irritativa, inspiratoria, compressiva, espiratoria
- D. inspiratoria, compressiva, rilassamento, espiratoria

17. Quali dei seguenti muscoli si attiva nella fase di espirazione a volume corrente:

- A. mm diaframma
- B. mm intercostali
- C. mm piccolo pettorale
- D. nessuno dei precedenti

18. Secondo la classificazione H&Y, un paziente con malattia di Parkinson che presenta sintomatologia con coinvolgimento bilaterale o mediano del corpo ma senza compromissione dell'equilibrio equivale allo stadio di malattia:

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

19. In un paziente con una massa tumorale situata nel lobo frontale, quale dei seguenti disturbi cognitivi posso aspettarmi di rilevare?

- A. difficoltà nel problem solving
- B. disinibizione
- C. disturbi di attenzione
- D. tutte le precedenti

20. La durata del lavaggio delle mani sociale deve essere di circa?

- A. 10-20secondi
- B. 20-40 secondi
- C. 40-60 secondi
- D. 30-40 secondi

21. In caso di un'emergenza con ritrovamento di una persona a terra la prima cosa da fare è?

- A. valutare l'ambiente ed eventuali pericoli annessi
- B. valutare lo stato di coscienza del malcapitato
- C. attivare i soccorsi chiamando il 112
- D. reperire il carrello delle emergenze

22. La mano ad artiglio è la tipica manifestazione di una lesione del nervo:

- A. ulnare
- B. mediano
- C. muscolocutaneo
- D. radiale

23. Un paziente affetto da sclerosi multipla può presentare segni di tipo:

- A. piramidale
- B. cerebellare
- C. vestibolare
- D. tutte le alternative precedenti sono corrette

24. Quale fra le seguenti fratture presenta il più alto rischio di necrosi della testa del femore?

- A. frattura sottocapitata
- B. frattura pertrocanterica
- C. frattura sottotrocanterica
- D. tutte le fratture di femore citate

25. Il morbo di Sudeck è:

- A. un'algoneurodistrofia
- B. una malattia geneticamente determinata
- C. una malattia reumatica
- D. una malattia respiratoria

26. Nei confronti di ortesi, ausili e protesi il fisioterapista può:

- A. collaudarli
- B. proporli
- C. prescriverli
- D. tutte le risposte sono corrette

27. La FIM è

- A. utilizzabile solo per pazienti anziani
- B. una tecnica di riabilitazione del paziente neurologico
- C. un'articolazione dell'arto inferiore
- D. una standard internazionale di misura della disabilità

28. Nella respirazione si definisce volume corrente

- A. la quantità di aria inspirata normalmente
- B. la quantità di aria che si inspira ed espira durante un atto respiratorio normale
- C. la quantità di aria che può essere espirata con un'espiazione forzata
- D. la quantità di aria espirata

29. Individui quale di queste affermazioni è scorretta:

- A. ci sono evidenze che una valutazione puntuale del rischio di caduta riduca il numero di cadute
- B. fra le complicanze tardive della caduta rientra la paura di cadere
- C. ci sono evidenze che le contenzioni riducano il rischio di caduta
- D. ci sono evidenze che un intervento multifattoriale riduca il rischio di caduta

30. Secondo il D. Lgs. 81/2008 al preposto spetta:

- A. la valutazione dei rischi
- B. la vigilanza sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- C. la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
- D. nessuna delle precedenti

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E N. 2 POSTI A TEMPO PARZIALE A 18 ORE SETTIMANALI A TEMPO INDETERMINATO IN FIGURA PROFESSIONALE DI FISIOTERAPISTA - CATEGORIA C – LIVELLO EVOLUTO – 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA CON RISERVA DI 1 POSTO PER I VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE

PROVA SCRITTA 2

1. **L'articolazione radiocarpica è:**
 - A. un'articolazione a sella
 - B. un'articolazione ginglimo angolare
 - C. un'articolazione ellissoide
 - D. un'articolazione enartrosi

2. **Quali dei seguenti componenti non attraversa il tunnel carpale:**
 - A. mm flessore ulnare del carpo
 - B. mm flessore radiale del carpo
 - C. mm flessore profondo delle dita
 - D. nervo mediano

3. **Il muscolo sartorio origina da:**
 - A. SIAI
 - B. legamento inguinale
 - C. SIAS
 - D. fossa iliaca

4. **La sindrome di Brown-Séguard comporta:**
 - A. solo disturbi sensitivi di tipo termodolorifico nell'emisoma omolaterale alla lesione
 - B. solo disturbi motori nell'emisoma omolaterale alla lesione
 - C. disturbi motori omolaterali e termodolorifici controlaterali alla lesione
 - D. disturbi motori controlaterali e termodolorifici omolaterali alla lesione

5. **I principali disturbi che caratterizzano la malattia di Parkinson sono:**
 - A. tremore a riposo, deficit di coordinazione, rigidità
 - B. tremore essenziale, rigidità ed acinesia
 - C. tremore essenziale, deficit di coordinazione, acinesia
 - D. tremore a riposo, rigidità ed acinesia

6. **La classificazione CDR 2 in un paziente con disturbi cognitivi indica:**
 - A. demenza lieve
 - B. demenza moderata
 - C. demenza grave
 - D. demenza molto grave

7. **Quale dei seguenti è il X nervo cranico:**
 - A. nervo trigemino
 - B. nervo glossofaringeo
 - C. nervo accessorio spinale
 - D. nervo vago

8. La memoria di lavoro fa parte della:

- A. memoria a breve termine
- B. memoria a lungo termine
- C. memoria episodica
- D. memoria procedurale

9. La Sclerosi Multipla è:

- A. una patologia autoimmune infiammatoria
- B. una patologia neurodegenerativa
- C. una patologia sia autoimmune infiammatoria che neurodegenerativa
- D. nessuna delle precedenti

10. La Glasgow Coma Scale (GCS) valuta:

- A. apertura degli occhi
- B. risposta verbale
- C. risposta motoria
- D. tutte le precedenti

11. La scala Barthel Index viene utilizzata per quantificare:

- A. il grado di autonomia del paziente nelle ADL
- B. la capacità di deambulare in sicurezza
- C. il rischio di caduta
- D. il grado di disfagia

12. Quale delle seguenti scale di valutazione è più utile per valutare la disfagia:

- A. Glasgow Coma Scale (GCS)
- B. Gugging Swallowing Screen (GUSS)
- C. Clinical Dementia Rating Scale (CDR)
- D. nessuna delle precedenti

13. Quale dei seguenti elementi non è un DPI:

- A. guanti in lattice
- B. estintore
- C. guanti in nitrile
- D. sovracamice

14. Quale delle seguenti scale può essere utilizzata per valutare le funzioni cognitive e/o l'orientamento s/t/p:

- A. SPMSQ
- B. MMSE
- C. MOKA
- D. tutte le precedenti

15. Quale dei seguenti ausili per i trasferimenti rientra nella categoria delle "ausili minori":

- A. disco girevole
- B. sollevatore passivo
- C. sollevatore attivo o verticalizzatore
- D. carrozzina pieghevole

16. Da quali fasi è caratterizzata la tosse:

- A. irritativa, inspiratoria, espiratoria, cessazione
- B. inspiratoria, compressiva, espiratoria, rilassamento
- C. irritativa, inspiratoria, compressiva, espiratoria
- D. inspiratoria, compressiva, rilassamento, espiratoria

17. Quali dei seguenti muscoli si attiva nella fase di espirazione a volume corrente:

- A. mm diaframma
- B. mm intercostali
- C. mm piccolo pettorale
- D. nessuno dei precedenti

18. Secondo la classificazione H&Y, un paziente con malattia di Parkinson che presenta sintomatologia con coinvolgimento bilaterale o mediano del corpo ma senza compromissione dell'equilibrio equivale allo stadio di malattia:

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

19. In un paziente con una massa tumorale situata nel lobo frontale, quale dei seguenti disturbi cognitivi posso aspettarmi di rilevare?

- A. difficoltà nel problem solving
- B. disinibizione
- C. disturbi di attenzione
- D. tutte le precedenti

20. La durata del lavaggio delle mani sociale deve essere di circa?

- A. 10-20secondi
- B. 20-40 secondi
- C. 40-60 secondi
- D. 30-40 secondi

21. In quale tipo di contrazione il muscolo sviluppa il massimo sforzo per tutta l'ampiezza del movimento, accorciandosi o allungandosi a velocità costante?

- A. contrazione isocinetica
- B. contrazione isometrica
- C. contrazione pliometrica
- D. nessuna delle precedenti

22. Individui la definizione di lesione da pressione di primo stadio:

- A. Lesioni a spessore parziale o vesciche
- B. Perdita tissutale a tutto spessore
- C. Nessuna delle precedenti
- D. Eritema non sbiancante alla digitopressione su cute integra

23. PAI è l'acronimo per:

- A. Piano Assistenza Individualizzato
- B. Piano Anziani Italiano
- C. Procedure Assistite Interne
- D. Presidi Assistenziali Interni

24. La protesi di ginocchio

- A. può essere totale o monocompartimentale
- B. può essere endoprotesi o artroprotesi
- C. è sempre indicata in caso di frattura del piatto tibiale
- D. generalmente provoca un accorciamento dell'arto

25. Il neglect è

- A. un disturbo visivo monolaterale
- B. un disturbo dell'attenzione relativo allo spazio controlaterale alla lesione
- C. un disturbo dell'articolazione della parola
- D. un disturbo tipico in caso di emiplegia destra

26. Quale dei seguenti tipi di andatura è caratteristico del soggetto affetto da patologia cerebellare?

- A. andatura falciante
- B. andatura atassica
- C. destinazione
- D. andatura a piccoli passi

27. Sono 3 test per la valutazione del rischio di caduta:

- A. Tinetti, Conley, Morse
- B. Tinetti, Norton, Barthel Index
- C. Braden, Motility Rating Scale, Noppain
- D. NPI, Barthel Index, Exton-Smith

28. Quale fra le seguenti fratture presenta il più alto rischio di necrosi della testa del femore?

- A. frattura sottocapitata
- B. frattura pertrocanterica
- C. frattura sottotrocanterica
- D. tutte le fratture di femore citate

29. Cosa si intende con il termine adiadococinesia?

- A. incapacità di frenare o arrestare prontamente un movimento in atto
- B. incapacità di eseguire rapidamente dei movimenti alternati opposti
- C. incapacità di svolgere un movimento preciso e coordinato in assenza di paralisi
- D. difficoltà a compiere azioni che implicano il movimento simultaneo di più articolazioni

30. In un paziente con malattia di Parkinson solitamente:

- A. non si verificano alterazioni posturali
- B. le alterazioni posturali si verificano solo durante la deambulazione
- C. il tremore è intenzionale
- D. tutte le risposte sono errate

PROVA SCRITTA 3

1. L'articolazione radiocarpica è:

- A. un'articolazione a sella
- B. un'articolazione ginglimo angolare
- C. un'articolazione ellissoide
- D. un'articolazione enartrosi

2. Quali dei seguenti componenti non attraversa il tunnel carpale:

- A. mm flessore ulnare del carpo
- B. mm flessore radiale del carpo
- C. mm flessore profondo delle dita
- D. nervo mediano

3. Il muscolo sartorio origina da:

- A. SIAI
- B. legamento inguinale
- C. SIAS
- D. fossa iliaca

4. La sindrome di Brown-Séguard comporta:

- A. solo disturbi sensitivi di tipo termodolorifico nell'emisoma omolaterale alla lesione
- B. solo disturbi motori nell'emisoma omolaterale alla lesione
- C. disturbi motori omolaterali e termodolorifici controlaterali alla lesione
- D. disturbi motori controlaterali e termodolorifici omolaterali alla lesione

5. I principali disturbi che caratterizzano la malattia di Parkinson sono:

- A. tremore a riposo, deficit di coordinazione, rigidità
- B. tremore essenziale, rigidità ed acinesia
- C. tremore essenziale, deficit di coordinazione, acinesia
- D. tremore a riposo, rigidità ed acinesia

6. La classificazione CDR 2 in un paziente con disturbi cognitivi indica:

- A. demenza lieve
- B. demenza moderata
- C. demenza grave
- D. demenza molto grave

7. Quale dei seguenti è il X nervo cranico:

- A. nervo trigemino
- B. nervo glossofaringeo
- C. nervo accessorio spinale
- D. nervo vago

8. La memoria di lavoro fa parte della:

- A. -memoria a breve termine
- B. -memoria a lungo termine
- C. -memoria episodica
- D. -memoria procedurale

9. La Sclerosi Multipla è:

- A. una patologia autoimmune infiammatoria
- B. una patologia neurodegenerativa
- C. una patologia sia autoimmune infiammatoria che neurodegenerativa
- D. nessuna delle precedenti

10. La Glasgow Coma Scale (GCS) valuta:

- A. apertura degli occhi
- B. risposta verbale
- C. risposta motoria
- D. tutte le precedenti

11. La scala Barthel Index viene utilizzata per quantificare:

- A. il grado di autonomia del paziente nelle ADL
- B. la capacità di deambulare in sicurezza
- C. il rischio di caduta
- D. il grado di disfagia

12. Quale delle seguenti scale di valutazione è più utile per valutare la disfagia:

- A. Glasgow Coma Scale (GCS)
- B. Gugging Swallowing Screen (GUSS)
- C. Clinical Dementia Rating Scale (CDR)
- D. nessuna delle precedenti

13. Quale dei seguenti elementi non è un DPI:

- A. guanti in lattice
- B. estintore
- C. guanti in nitrile
- D. sovracamice

14. Quale delle seguenti scale può essere utilizzata per valutare le funzioni cognitive e/o l'orientamento s/t/p:

- A. SPMSQ
- B. MMSE
- C. MOKA
- D. tutte le precedenti

15. Quale dei seguenti ausili per i trasferimenti rientra nella categoria delle "ausili minori":

- A. disco girevole
- B. sollevatore passivo
- C. sollevatore attivo o verticalizzatore
- D. carrozzina pieghevole

16. Da quali fasi è caratterizzata la tosse:

- A. irritativa, inspiratoria, espiratoria, cessazione
- B. inspiratoria, compressiva, espiratoria, rilassamento
- C. irritativa, inspiratoria, compressiva, espiratoria
- D. inspiratoria, compressiva, rilassamento, espiratoria

17. Quali dei seguenti muscoli si attiva nella fase di espirazione a volume corrente:

- A. mm diaframma
- B. mm intercostali
- C. mm piccolo pettorale
- D. nessuno dei precedenti

18. Secondo la classificazione H&Y, un paziente con malattia di Parkinson che presenta sintomatologia con coinvolgimento bilaterale o mediano del corpo ma senza compromissione dell'equilibrio equivale allo stadio di malattia:

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

19. In un paziente con una massa tumorale situata nel lobo frontale, quale dei seguenti disturbi cognitivi posso aspettarmi di rilevare?

- A. difficoltà nel problem solving
- B. disinibizione
- C. disturbi di attenzione
- D. tutte le precedenti

20. La durata del lavaggio delle mani sociale deve essere di circa?

- A. 10-20secondi
- B. 20-40 secondi
- C. 40-60 secondi
- D. 30-40 secondi

21. Quali sedi di lesione da pressione sono caratteristiche di una posizione supina prolungata nel tempo?

- A. regione trocanterica, cresta iliaca, malleoli, bordo esterno del piede, ginocchio, spalla, gomito, padiglione auricolare
- B. zigomo, regione temporale, padiglione auricolare, arcate costali, spina iliaca anterosuperiore
- C. regione sacrale, apofisi spinose vertebrali, spina della scapola, nuca e talloni
- D. gomito, coccige, regione ischiatica, regioni laterali delle cosce

22. Nella sindrome del tunnel carpale viene interessato il:

- A. nervo mediano
- B. nervo ulnare
- C. nervo radiale
- D. nervo muscolocutaneo

23. Secondo il D. Lgs. 81/2008 al preposto spetta:

- A. la valutazione dei rischi
- B. la vigilanza sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro
- C. la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
- D. nessuna delle precedenti

24. La disfagia è:

- A. disturbo della deglutizione
- B. turba della respirazione
- C. disturbo nell'esecuzione di un movimento finalizzato
- D. disturbo del linguaggio

25. Il termine clinico iperalgesia è essenzialmente definito come:

- A. dolore primitivo o causato da una lesione primaria o da una disfunzione del SNC
- B. una sensazione dolorosa dovuta ad uno stimolo che normalmente non provoca dolore
- C. una aumentata risposta ad uno stimolo che è normalmente doloroso
- D. dolore diminuito in risposta ad uno stimolo normalmente doloroso

26. La scala di Tinetti viene impiegata per

- A. misurare il livello di autonomia nelle attività della vita quotidiana
- B. valutare l'equilibrio ed il rischio cadute
- C. scegliere l'ausilio idoneo al cammino
- D. quantificare il rischio da movimentazione carichi

27. Per essere in grado di effettuare il passaggio dalla posizione seduta a quella eretta, il paziente emiplegico

- A. non deve presentare disturbi cognitivi
- B. non deve presentare disturbi della sensibilità
- C. deve aver acquisito un buon controllo dell'arto inferiore
- D. deve aver acquisito un buon controllo del tronco

28. Individui quale di queste affermazioni è scorretta:

- A. ci sono evidenze che una valutazione puntuale del rischio di caduta riduca il numero di cadute
- B. fra le complicanze tardive della caduta rientra la paura di cadere
- C. ci sono evidenze che le contenzioni riducano il rischio di caduta
- D. ci sono evidenze che un intervento multifattoriale riduca il rischio di caduta

29. Segno di Neer, Test di Jobe, test Empty Can sono test per la valutazione di

- A. anca
- B. spalla
- C. colonna cervicale
- D. gomito

30. In caso di un'emergenza con ritrovamento di una persona a terra la prima cosa da fare è?

- A. valutare l'ambiente ed eventuali pericoli annessi
- B. valutare lo stato di coscienza del malcapitato
- C. attivare i soccorsi chiamando il 112
- D. reperire il carrello delle emergenze

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E N. 2 POSTI A TEMPO PARZIALE A 18 ORE SETTIMANALI A TEMPO INDETERMINATO IN FIGURA PROFESSIONALE DI FISIOTERAPISTA - CATEGORIA C – LIVELLO EVOLUTO – 1^A POSIZIONE RETRIBUTIVA CON RISERVA DI 1 POSTO PER I VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE

PROVA SCRITTA A CONTENUTO PRATICO 1

La Sig.ra Celeste (95 anni) è residente in struttura già da più di 1 anno, ed ha una figlia unica molto presente ed apprensiva. Celeste presenta le seguenti patologie: grave deterioramento cognitivo, diabete mellito tipo II, esiti di ictus cerebrale ischemico, insufficienza renale cronica, cardiopatia ischemica cronica. 5 mesi fa è caduta dal letto con conseguente frattura di femore dx, operata con posizionamento endoprotesi anca dx, e da allora non ha più recuperato il cammino ma riesce a mantenere il carico sugli AAIL. Al momento utilizza la carrozzina pieghevole per gli spostamenti, alla quale viene applicata una cintura pelvica contenitiva con fissaggio a calamita, e quando è a letto si posiziona una cintura addominale contenitiva anch'essa con fissaggio a calamita; entrambe le contenzioni sono state richieste espressamente dalla figlia per la paura che la signora cada nuovamente.

Con le informazioni fornite rispondi ai seguenti quesiti:

1. Con quale altra figura professionale ti rapporti per discutere il caso e perché? In quale occasione?
2. In che modo e attraverso quali proposte/strategie intervieni per ridurre l'uso delle contenzioni in questo caso specifico?

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E N. 2 POSTI A TEMPO PARZIALE A 18 ORE SETTIMANALI A TEMPO INDETERMINATO IN FIGURA PROFESSIONALE DI FISIOTERAPISTA - CATEGORIA C – LIVELLO EVOLUTO – 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA CON RISERVA DI 1 POSTO PER I VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE

PROVA SCRITTA A CONTENUTO PRATICO 2

La Sig.ra Vilma (85 anni) arriva oggi in struttura come nuovo residente su posto UVM, proviene da una struttura ospedaliera. Nella documentazione pervenuta pre-ingresso si riportano le seguenti informazioni: fino a 2 mesi fa viveva a domicilio con la badante dove deambulava con girello in autonomia, era lucida e orientata, ma poi è stata ricoverata in ospedale per intervento di posizionamento PMK programmato. Successivamente all'intervento appare spesso confusa, a tratti disinibita, e a pochi giorni di distanza da esso contrae una polmonite che prolunga la degenza ospedaliera per circa 20 giorni totali. Al momento risulta guarita dall'evento acuto ma mantiene ossigenoterapia continuativa con 1 L/min, collaborante, riesce ad effettuare i trasferimenti letto-carrozzina con aiuto di 1 operatore.

Con le informazioni fornite rispondi ai seguenti quesiti:

1. Quali 3 aspetti indagheresti principalmente nella valutazione di ingresso e perché?
2. Quali obiettivi riabilitativi ti porresti a breve e lungo termine e perché?

CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO A TEMPO PIENO E N. 2 POSTI A TEMPO PARZIALE A 18 ORE SETTIMANALI A TEMPO INDETERMINATO IN FIGURA PROFESSIONALE DI FISIOTERAPISTA - CATEGORIA C – LIVELLO EVOLUTO – 1^A POSIZIONE RETRIBUTIVA CON RISERVA DI 1 POSTO PER I VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE

PROVA SCRITTA A CONTENUTO PRATICO 3

Il Signor Massimo ha 68 anni ed è in struttura già da 1 anno. Egli presenta una forma di schizofrenia paranoide, positivo per HCV, non sempre è collaborante, deambula senza ausili in autonomia con wandering continuo. Tende sempre a prendere e portare con sé piccoli oggetti che riesce a trovare, ed a volte esce dalla struttura senza avvisare nessuno. Non abbiamo familiari a cui rivolgerci, è seguito da un avvocato in qualità di ADS. Con le informazioni fornite rispondi ai seguenti quesiti:

1. Quali strategie non farmacologiche potresti proporre per gestire il caso? Con quali figure ti confronti per la gestione e in che occasione?
2. Scrivi il PAI di questo ospite (situazione attuale e criticità, obiettivi, strategie).